



Feuille d'exercices 3

Exercice 1. Soit X un espace métrique.

1. Montrer qu'une intersection quelconque de compacts est compacte.
2. Montrer qu'une réunion finie de compacts est compacte. Pourquoi est-il important de préciser « finie » ?

Exercice 2. Parmi les parties suivantes de \mathbb{R} ou \mathbb{R}^2 , déterminer lesquelles sont compactes :
(i) $[0, 1[$; (ii) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$; (iii) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$; (iv) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - x^2 = 1\}$;
(v) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 = 1\}$

Exercice 3. Dans $M_n(\mathbb{R})$ muni de la topologie usuelle, déterminer si les parties suivantes sont compactes : (i) l'ensemble des matrices inversibles; (ii) l'ensemble des matrices diagonales; (iii) l'ensemble des matrices de déterminant 1; (iv) l'ensemble $O(n)$ des matrices orthogonales; (v) l'ensemble $SO(n)$ des matrices orthogonales de déterminant 1.

Exercice 4. Soit (X, d) un espace métrique. Si A, B sont deux parties de X , on pose $d(A, B) := \inf\{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$.

1. Montrer que ceci ne définit pas une distance sur $\mathcal{P}(X)$.
2. Si A et B sont deux compacts non vides de X , montrer qu'il existe $a \in A$ et $b \in B$ tels que $d(A, B) = d(a, b)$.
3. Lorsque $X = \mathbb{R}^n$ usuel, montrer que la conclusion de la question précédente est encore vraie si on ne suppose que A compact et B fermé.
4. Donner un exemple de deux fermés A, B de \mathbb{R}^2 tels que $d(A, B) = 0$ mais $d(x, y) > 0$ quels que soient $x \in A$ et $y \in B$.

Exercice 5. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement croissante telle que $\lim_{u \rightarrow -\infty} \varphi(u) = -1$ et $\lim_{u \rightarrow +\infty} \varphi(u) = +1$. On prolonge φ à l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ en posant $\varphi(\pm\infty) := \pm 1$. On pose alors :

$$d(x, y) := |\varphi(x) - \varphi(y)| \quad \forall x, y \in \overline{\mathbb{R}}$$

1. Montrer que d est une distance sur $\overline{\mathbb{R}}$, et que $\varphi : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1]$ est un homéomorphisme.
2. En déduire que $(\overline{\mathbb{R}}, d)$ est un espace métrique compact, et que la restriction de d à \mathbb{R} induit la topologie usuelle sur \mathbb{R} . Montrer que \mathbb{Q} est dense dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Exercice 6. Soient A et B deux compacts disjoints d'un espace métrique (X, d) . Montrer qu'il existe deux ouverts disjoints U et V tels que $A \subset U$ et $B \subset V$. Si vous avez utilisé la distance pour construire U et V , essayez maintenant de démontrer ce résultat dans un espace topologique *séparé* X , sans distance.

Exercice 7. Soit K un compact d'un espace métrique (X, d) , et soit U un ouvert de X qui contient K . Montrer qu'il existe un réel $r > 0$ tel que, quel que soit $x \in X$, si $d(x, K) < r$ alors $x \in U$.

Exercice 8. On considère l'espace vectoriel normé ℓ^∞ (suites réelles bornées) muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que la boule unité fermée n'est pas compacte, en construisant une suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de points de la boule unité fermée telle que $d_\infty(x^{(k)}, x^{(l)})$ soit toujours « grande » si $k \neq l$.

Exercice 9. Soit X un espace métrique compact. Montrer que si une suite de points de X ne possède qu'une seule valeur d'adhérence, alors elle est convergente. Construire un exemple pour voir que l'hypothèse de compacité est essentielle.

Exercice 10. Soit X un espace métrique compact, et soit $f : X \rightarrow X$ une application telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ quels que soient $x, y \in X$ distincts.

1. Montrer qu'il existe un point $a \in X$ tel que $d(a, f(a)) \leq d(x, f(x))$ pour tout $x \in X$.
2. Montrer que ce point a est l'unique point fixe de f .

Exercice 11. Soit X un espace métrique. On considère une suite décroissante $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de parties compactes non vides de X .

1. Rappeler pourquoi $K := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ n'est pas vide.
2. Montrer que si U est un ouvert de X contenant K , alors il existe un $n \in \mathbb{N}$ tel que U contienne K_n .

Exercice 12. Soit X un espace topologique compact, et soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite *monotone* de fonctions continues $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction continue $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que la convergence est uniforme.

Exercices supplémentaires

Exercice 13. Le but de cet exercice est de démontrer que le produit de deux espaces topologiques compacts est compact. Soient (X, \mathcal{O}_X) et (Y, \mathcal{O}_Y) deux espaces compacts. On sait déjà que $X \times Y$, muni de la topologie produit, est séparé, donc il ne reste plus qu'à étudier la propriété de recouvrement ouvert.

Soit $(W_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de $X \times Y$. On dit qu'un sous-ensemble $A \subset X$ est **bon** s'il existe une sous-famille finie de $(W_i)_{i \in I}$ qui recouvre $A \times Y$.

1. Montrer que si A_1, \dots, A_N sont bons, alors $A_1 \cup \dots \cup A_N$ est bon également.
2. On veut montrer que pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert $U(x)$ de x dans X qui est bon. Pour cela :
 - a) Soit $y \in Y$ fixé dans cette question. Pourquoi existe-t-il un $i(y) \in I$ tel que $(x, y) \in W_{i(y)}$? En déduire qu'il existe un voisinage ouvert $U(y)$ de x dans X , et un voisinage $V(y)$ de y dans Y , tels que $(x, y) \in U(y) \times V(y) \subseteq W_{i(y)}$.
 - b) Montrer qu'il existe $y_1, \dots, y_N \in Y$ tels que $Y = V(y_1) \cup \dots \cup V(y_N)$.
 - c) En déduire que $U(y_1) \cap \dots \cap U(y_N)$ est bon.
3. En déduire que X est bon, et observer que c'est ce qu'on voulait montrer.

Exercice 14. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue. On suppose que X est compact.

1. Montrer que f est une application **fermée**, au sens où l'image $f(F)$ de tout fermé F de X est un fermé de Y .
2. On suppose de plus que f est bijective. Montrer qu'alors f est un homéomorphisme.

Exercice 15. Montrer que tout métrique compact X est **séparable**, c'est-à-dire qu'il existe une partie finie ou dénombrable A qui est dense dans X .

Exercice 16. On se place dans \mathbb{R}^n usuel. Si A et B sont deux parties non vides de \mathbb{R}^n , on définit une nouvelle partie $A + B$ par :

$$A + B := \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

1. Montrer que si A est ouverte, alors $A + B$ est ouverte.
2. Montrer que si A et B sont compactes, alors $A + B$ est compacte.
3. Montrer que si A est compacte et B est fermée, alors $A + B$ est fermée.
4. Trouver un exemple (dans \mathbb{R}^2) avec A et B fermées, mais $A + B$ non fermée.

Exercice 17. Soient X et Y deux espaces métriques, et soit $f : X \rightarrow Y$ une application. On suppose que la restriction de f à tout compact de X est continue. Montrer qu'alors f est continue, par exemple de la manière suivante :

1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de points de X qui converge vers $a \in X$. Que peut-on dire de l'ensemble $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$? Que peut-on en déduire sur l'ensemble $\{f(x_n) \mid n \in \mathbb{N}\}$?
2. En déduire que f est séquentiellement continue en tout point de X .

Exercice 18. On se place dans $X = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la distance d_∞ . Montrer que le sous-ensemble $\{f \in X \mid f([0, 1]) = [0, 1]\}$ est fermé et d'intérieur vide.

Exercice 19. Suite de l'exercice 10. Soit X un espace métrique compact, et soit $f : X \rightarrow X$ une application telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ quels que soient $x, y \in X$ distincts. On veut montrer qu'il est « facile » de trouver une approximation de l'unique point fixe de f . Pour cela, soit x_0 n'importe quel point de X . On définit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence, en posant $x_{n+1} := f(x_n)$ pour tout $n \geq 0$.

1. Montrer que la suite réelle $(d(x_n, a))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
2. Soit $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite convergeant vers $b \in X$. Que peut-on dire de la suite $((x_{\varphi(n)+1})_{n \in \mathbb{N}}$? En déduire que $b = a$, puis que $x_n \rightarrow a$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 20. Soit K une partie compacte non vide de \mathbb{R}^n muni de la distance euclidienne. Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe une unique boule fermée de rayon minimal qui contient K . Pour cela :

1. Pourquoi existe-t-il une boule fermée contenant K ?
2. Soit $\rho := \inf\{r > 0 \mid \exists x \in X, K \subseteq D(x, r)\}$. Montrer qu'il existe un point $a \in X$ tel que $K \subseteq D(a, \rho)$, ce qui prouve qu'il existe bien *une* boule de rayon minimal qui contient K ...
3. Si K est contenu dans $D(a, \rho)$ et dans $D(b, \rho)$ avec $a \neq b$, montrer qu'il est aussi contenu dans une boule fermée de centre $(a + b)/2$ et de rayon $r < \rho$. Que peut-on en conclure?

Exercice 21. Soit X un espace métrique compact, et soit $f : X \rightarrow X$ une application continue.

1. On pose $K_1 := f(X)$ puis, par récurrence, $K_{n+1} := f(K_n)$. Montrer que $\bigcap_{n \geq 1} K_n \neq \emptyset$.
2. En déduire qu'il existe un sous-ensemble non vide A de X tel que $f(A) = A$.

Exercice 22. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application continue, et soit $a \in \mathbb{R}^n$ un point donné. On définit une suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ par récurrence, en posant $x_0 := a$ et $x_{k+1} := f(x_k)$ pour $n \geq 0$. On suppose que la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ne possède qu'une seule valeur d'adhérence. Montrer qu'elle converge.