

TD 3 : NumPy et matplotlib

Exercice 3.1 : Manipulation des tableaux

- Créer un tableau de nombres flottants 1.5, 2, 2.5 ... 10.5, 11.
- Réarranger dans un tableau 4×5 avec la fonction `numpy.reshape()`.
- De ce tableau, extraire les colonnes aux indices impairs.
- Extraire les lignes à partir de l'indice 2.
- De la dernière ligne, extraire les éléments aux indices pairs à partir de 2.

Exercice 3.2 : Calcul matriciel avec NumPy (système à trois niveaux)

Pour un système quantique à trois niveaux, on donne le hamiltonien

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & \epsilon & \delta \\ \epsilon^* & E_2 & \eta \\ \delta^* & \eta^* & E_3 \end{pmatrix}$$

où $E_{1,2,3}$ et ϵ, δ, η sont des constantes de dimension d'énergie. Ici on prendra $E_1 = 1, E_2 = 2, E_3 = 4, \epsilon = -1/3, \delta = -1/2, \eta = 0$ en unités où $\hbar = 1$.

- Réaliser une fonction `hmoyenne(psi)` qui calcule $\langle \hat{H} \rangle$ dans un état quelconque $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix}$, avec $\psi_{1,2,3}$ des nombres complexes. Calculer $\langle \hat{H} \rangle$ dans l'état $|\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Pour rappel, si l'état du système au temps $t = 0$ est $|\psi(0)\rangle$, alors au temps t il sera donné par

$$|\psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)|\psi(0)\rangle$$

selon l'équation de Schrödinger. Ici l'exponentielle d'une matrice est définie par la série de Taylor

$$\exp(\hat{A}) = \mathbb{1} + \hat{A} + \frac{1}{2}\hat{A}^2 + \frac{1}{3!}\hat{A}^3 + \dots + \frac{1}{n!}\hat{A}^n + \dots$$

où les puissances des matrices sont définies avec le produit matriciel.

Réaliser une fonction `expmat(A, N=40)` qui renvoie une approximation $\sum_{n=0}^N \hat{A}^n/n!$ de l'exponentielle de la matrice **A**. On suppose qu'au temps $t = 0$ le système soit dans l'état $|\psi(0)\rangle = |\psi_0\rangle$ comme défini ci-dessus. Calculer $|\psi(t)\rangle$ à $t = 3$.

- La fonction `eig(A)`, définie dans la bibliothèque `scipy.linalg`, prend comme argument une matrice carrée **A**. Elle renvoie un tableau 1-dimensionnel **w** contenant ses valeurs propres et un tableau 2-dimensionnel **vr** dont les vecteurs de colonne sont ses vecteurs propres. Se servir de cette fonction pour calculer l'énergie de l'état fondamental du système. Afficher le résultat à l'écran.

Exercice 3.3 : Tracer une fonction

Pour le système quantique d'exercice 3.2, tracer $|\langle \psi_0 | \psi(t) \rangle|^2$ en fonction de t pour $t \in [0, 3]$.

Exercice 3.4 : Importer et visualiser des données

Dans le fichier `647_Global_Temperature_Data_File.txt` vous trouvez les déviations ΔT de la température moyenne globale par rapport à T_0 , où T_0 est la température moyenne entre 1951 et 1980. Première colonne : année, deuxième colonne : ΔT en °C, troisième colonne : $\overline{\Delta T}$ (ΔT moyennée sur 5 ans).

(Source : <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/>)

- Tracer ΔT et $\overline{\Delta T}$ en fonction du temps.
- Faire un histogramme de ΔT .

Exercice 3.5 : Diagramme de bifurcation (★)

La suite *logistique* est récursivement définie par

$$x_0 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = r x_n (1 - x_n).$$

Ici $r \geq 0$ est un paramètre constant dont la valeur détermine le comportement asymptotique de la suite. Plus précisément, pour $0 \leq r \leq 3$, la suite converge ; pour $3 < r \lesssim 3.6$, elle se compose d'un nombre fini de sous-suites convergentes ; pour $r \gtrsim 3.6$, le comportement est largement chaotique, à part certains intervalles qui donnent lieu aux structures plus régulières. L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite logistique numériquement par son *diagramme de bifurcation* ou *diagramme de Feigenbaum*.

- Pour 1000 valeurs de r entre 2.5 et 4, calculer les x_n pour $0 \leq n \leq 200$. Enregistrer ces 201 000 nombres dans un fichier `logistique.dat`.
- Avec un deuxième programme, importer les données de `logistique.dat` et tracer $x_{100}, x_{101}, x_{102} \dots x_{200}$ en fonction de r entre $r = 2.5$ et $r = 4$, tout dans le même graphique. Pour l'affichage, utiliser des marqueurs pixel créés avec une virgule ',' dans l'appel de `matplotlib.pyplot.plot()`.

Exercice 3.6 : Graphiques des fonctions de deux variables

La fonction d'onde de l'état $|n = 4, \ell = 3, m = 1\rangle$ de l'atome d'hydrogène est donnée en coordonnées cartésiennes par

$$\psi_{431}(x, y, z) = N \exp(-r/4) \frac{(x + iy) z (7z^2 - 3r^2)}{r}$$

où $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, N est une constante de normalisation (on prendra $N = 1$), et toutes les quantités sont en unités du rayon de Bohr a_0 .

Visualiser la densité de probabilité $|\psi_{431}|^2$ dans le plan (x, z) pour x et z entre $-20 a_0$ et $20 a_0$

- par des courbes de niveau,
- par une carte de chaleur.