TD 6 : Diagonalisation

Exercice 1 :
Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3x+4y \\ 4x-3y \end{pmatrix}.$$

1. Écrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On la notera A.
2. Montrer que le vecteur $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de f. Quelle est la valeur propre associée ?
3. Montrer que le vecteur $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de f. Quelle est la valeur propre associée ?
4. Calculer l'image du vecteur $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ par f.
5. Montrer que la famille (v_1, v_2) forme une base de $\mathbb{R}^2$.
6. Quelle est la matrice de f dans la base (v_1, v_2) ? On la notera D.
7. Soit P la matrice dont la première colonne contient les coordonnées du vecteur v_1 dans la base canonique et la deuxième celles du vecteur v_2. Calculer P^{-1}.
8. Quelle relation y a-t-il entre A, P, P^{-1} et D ?
9. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2 :
Rechercher les valeurs propres et vecteurs propres des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & a & 0 \\ -1 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 :
Trouver une matrice carrée inversible P telle que $B = P^{-1}AP$ soit diagonale et écrire la matrice B obtenue, pour les matrices A suivantes

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 7 & 3 & -9 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4 :
Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A admet une valeur propre double, notée λ_0, et une simple, notée λ_1.
2. (a) Donner une base de $\mathrm{Ker}(A - \lambda_0 I)$ et de $\mathrm{Ker}(A - \lambda_1 I)$, où I désigne la matrice identité de taille 3.
   (b) A est diagonalisable. Justifier cette affirmation et diagonaliser A.

Exercice 5 :
Soient

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer Mv_1 et Mv_2.
2. En déduire la valeur de $M^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 6 :
Soit

$$M = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $M^2 + M - \mu I$ est la matrice nulle. I désigne la matrice identité de taille 3.
2. En déduire que M est inversible et que M^{-1} se calcule simplement en fonction de M.
3. On pose $\chi(\lambda) = \det(M - \lambda I)$. Factoriser χ et comparer avec les racines de $\pi(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 2$.