CHIP - PIPAC

Institut régional du **Cancer**
Montpellier | *Val d'Aurelle*

Christel ROUGET IBODE

IFSI Montpellier - Mars 2024

Scénario

CHIP

Chimiothérapie hyperthermique IntraPéritonéale

PIPAC

Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy

Péritoine

Péritoine = Organe

**Membrane séreuse
tapissant la paroi
abdominale et
les viscères intra-
abdominaux**

Péritoine

2 feuillets : viscéral et pariétal

Entre : cavité péritonéale

Rencontre des 2 feuillets :
Méso (vascularisation)

Physiopathologie

Carcinose péritonéale

Origine primitive

- Pseudomyxome péritonéal (PMP)
- Mésothéliome péritonéal

Origine secondaire

Métastase cancer d'origine digestive (colon, rectum, estomac ...) et gynécologique (ovaire)

Physiopathologie

Pseudomyxome péritonéal (ascite gélatineux)

- Maladie rare
- Épanchement mucine (gélatineux) variable, localisée ou diffuse
- 90 % origine appendiculaire (tumeur mucineuse rompue)

Physiopathologie

Mésothéliome péritonéal

- Tumeur maligne primitive des cellules pariétales (mésothélium) de la cavité péritonéale

- Envahissement diffus des surfaces péritonéales (évolution loco-régionale). Rares atteintes ganglionnaires et métastatiques

- FR : amiante +++

Physiopathologie

Carcinose secondaire : métastase

- Dissémination de cellules cancéreuses sur tout ou partie de la séreuse péritonéale

- Localisation variable : selon le primitif
- Évolution grave : stade métastatique terminal

Prise en charge thérapeutique

→ Coelioscopie ou laparotomie exploratrice

* Si maladie résécable :

- Chirurgie de cytoréduction maximale (CRS)
- + / - CHIP
- + / - Chimiothérapie systémique

* Si maladie NON résécable :

- Chimiothérapie systémique
- PIPAC

Résacabilité : calcul du PCI

PCI : Indice de Carcinose Péritonéal (de 0 à 39)

<u>Regions</u>	<u>Lesion Size</u>
0 Central	<u>0</u>
1 Right Upper	<u>2</u>
2 Epigastrium	<u>3</u>
3 Left Upper	<u>0</u>
4 Left Flank	<u>1</u>
5 Left Lower	<u>1</u>
6 Pelvis	<u>0</u>
7 Right Lower	<u>0</u>
8 Right Flank	<u>2</u>
9 Upper Jejunum	<u>0</u>
10 Lower Jejunum	<u>3</u>
11 Upper Ileum	<u>1</u>
12 Lower Ileum	<u>3</u>

PCI 16

13 zones

En fonction de la présence de lésions, de leur taille : attribution d'un chiffre de 1 à 3

- Lésion(s) <5mm → 1
- 5mm <lésion(s) <5cm → 2
- 5cm < lésion(s) ou confluentes → 3

Indice maxi = 39

Résacabilité : calcul du PCI

Exemple

Sugarbaker peritoneal cancer index

<u>Regions</u>	<u>Lesion Size</u>
0 Central	<u>0</u>
1 Right Upper	<u>2</u>
2 Epigastrium	<u>3</u>
3 Left Upper	<u>0</u>
4 Left Flank	<u>1</u>
5 Left Lower	<u>1</u>
6 Pelvis	<u>0</u>
7 Right Lower	<u>0</u>
8 Right Flank	<u>2</u>
9 Upper Jejunum	<u>0</u>
10 Lower Jejunum	<u>3</u>
11 Upper Ileum	<u>1</u>
12 Lower Ileum	<u>3</u>

<u>Lesion Size Score</u>
LS 0 No tumor seen
LS 1 Tumor up to 0.5
LS 2 Tumor up to 5.0
LS 3 Tumor > 5.0 cm

PCI

16

CHIP : Principe

- **Chirurgie DE CYTORÉDUCTION** des lésions visibles
- + puis**
- **CHIMIOTHÉRAPIE PER OPÉRATOIRE** des lésions infra-millimétriques résiduelles
- avec**
- **HYPERTHERMIE** (potentialise la cytotoxicité, la pénétration tissulaire et intracellulaire, crée des micro-thromboses qui perturbent la vascularisation et activent les défenses immunitaires anti-tumorales)

CHIP « ouverte »: Principe

CHIP : Préparation

* Fonctionnalité de la salle et des équipements :

- MECSS
- Chariot IBODE avec matériel nécessaire à la CRS et la CHIP
- GHF et Ultracision
- Aspiration spécifique avec gel x3

CHIP : Préparation

* **Matériel spécifique CHIP :**

Dispositif (machine)

CHIP : Sunship2 à

ICM

CHIP : Préparation

* Matériel spécifique CHIP :

Aspirateur de particules (fumée) /
EPI dont tapis de protection

CHIP : Préparation

* Matériel spécifique CHIP :

Container matériel CHIP : Bras de Gray, de CHIP, cadre de Gray, Vicryl 2

CHIP : Préparation

*** Matériel spécifique CHIP :**

**Consommables CHIP
(circuits à UU, eau distillée ...)**

CHIP : Configuration de la salle

CHIP : Installation du patient

- Accueil du patient (CheckList, APD, VVC) : communication positive
- Installation chirurgicale : DD, bras abd, jambes écartées, fesses en débord de la table

CHIP : Installation du patient

- Installation chirurgicale : DD, bras abd, jambes écartées, fesses en débord de la table

CHIP : 1^{er} temps → CRS

* Résection des lésions visibles :

Omentectomie / Dépéritonisation
(coupes diaphragmatiques, cul de sac de Douglass, gouttières pariétocoliques)

CHIP : 1^{er} temps → CRS

* Destruction des nodules millimétriques visibles

Électrofugation (bistouri boule)

* Exérèse des organes atteints

Pelvectomies moyenne, postérieure, colectomie,
... puis **anastomose(s)** avant la CHIP

* Hémostases ++++++

CHIP : Déroulement

* Préparation de la table d'instrumentation CHIP

CHIP : Déroulement

* Calibrage du dispositif CHIP

CHIP : Déroulement

* Installation chirurgicale du cadre et des bras

CHIP : Déroulement

*** Mise en place du Colisée**

CHIP : Déroulement

* Mise en place des circuits

CHIP : Déroulement

*** Mise en place des circuits**

CHIP : Déroulement : vidéo

CHIP : Déroulement

* Mise en place du bain sans la chimiothérapie

Sérum physiologique ou dialysat péritonéal
(1,8 % glucose) préchauffé :
volume déterminé par la pharmacie (s² corp.)

* Mise en place des EPI

CHIP : Déroulement

- **Quand la température adéquate (entre 41°C et 43 °) est atteinte : ajout chimioTh**

Oxaliplatine (250 mg/cm²)
ou Mytomyicine (35 mg/cm²)
ou Cisplatine (100mg/cm²) + Thiosulfate en IVSE

*** Bain de chimiothérapie**

Entre 30 min et 90 min

CHIP : Déroulement : vidéo

CHIP : Déroulement

* Temps écoulé : fermeture

- Aspiration du bain de chimioTh
- Rinçage (volume équivalent à celui du bain à une température modérée)
- Vérification des hémostases
- Drainage
- Checklist et Fermeture

CHIP : Devenir

- Hospitalisation entre 4 et 7 jours en Soins Continus
- Suivie de 10 à 14 jours en service de soins
- Le retour à une alimentation classique n'est pas immédiat et le délai est variable en fonction de l'étendue de la chirurgie. Une alimentation parentérale peut-être mise en place
- Long terme : surveillance (scanner thoracopelvien) / 6 mois

CHIP : Complications et risques

- **Per-opératoire : Hyperthermie, Variation volémique, Hyperglycémie, brèche pleurale**
- **Liée à la chimioTh : hémorragie, néphrotoxicité, péritonite allergique**
- **Liée à la chirurgie : fistule, péritonite, éventration ...**
- **Toxicité pour le personnel →EPI**

CHIP : Conclusion

CHIP : Autres méthodes

* CHIP à ventre fermé

* CHIP coelioscopique

Patients non résecables ?????

Depuis juillet 2016 à l'ICM

→ **PIPAC**

Vaporisation sous haute pression
de chimiothérapie en intrapéritonale
par voie coelioscopique

À visée palliative ou à visée curative
(conversion à la résecabilité, chirurgie secondaire)

PIPAC : Principe

PIPAC : Principe

Pulvérisation d'aérosols sous pression = répartition homogène

PIPAC : Principe

- Vaporisation pendant 7 min puis temps de pose pendant 30 min (ePIPAC: temps de pose 6 min)
- Possibilité de répétition toutes les 6 semaines (possibilité de chimiothérapie systémique pendant les intercures)
- **Ce n'est pas une CHIP:** pas de résection pendant les procédures PIPAC, pas de lavage, pas d'hyperthermie, doses de chimiothérapie **moindres** (Cisplatine à 7,5 mg/m² vs 100 mg/m² pour la CHIP, Oxaliplatine à 92 mg/m² vs 250 mg/m²)

PIPAC : CheckList supplémentaire

- Avant l'induction et avant de commencer la chirurgie
- Vérification des équipements / installation
- * Avant la pulvérisation
- * Fin de la procédure

Avant de commencer

- Identité Patient OK
- Vérif procédure chirurgicale prévue OK
- Equipement de sécurité présent et utilisable
- Tous les membres du personnel protégés (lunette, gants, masques FFP3 et combinaison de sécurité)
- Conteneur à déchets présent
- Draps de protection posés sous l'injecteur et la table d'opération
- Prescription informatique/papier pour les agents chimiothérapeutiques (à confirmer à 3060 après open coelio)
- Fiche PIPAC informatique/papier prête à être complétée
- Dispositif ERBE en salle

Préparation procédure

- Confirmation téléphonique pour la chimio après succes open
- Index de Carcinose Péritonéale (PCI) et volume de l'ascite documentés
- Biopsies diagnostiques prélevées
- Enregistreur vidéo/photo activé
- Agents chimiques présents en salle d'opération? Contrôle de l'étiquetage (nom patient, dose, contenu)
- Pneumopéritoine étanche avec 12 mm Hg Co2 (flux max. Co2=0.2L/min)
- 2 joints orange PIPAC au niveau des orifices trocart
- Placement du trocart de caméra : bouchon sur le port du ballonnet installé ?
- Capteur étanche d'aérosols usagés installé sur le port du trocart de caméra ? valve fermée ? Connexion murale ?
- Caméra insérée dans le trocart
- Placement du trocart de 12mm : bouchon installé sur le port du ballonnet
- Adaptation de la tubulure du CO2 au trocart de 12 mm (port d'insufflation ouvert)
- Buse insérée dans le port du trocart de 12 mm ? Flucutation libre, pas de contact avec les anses intestinales ?
- La tubulure est-elle une tubulure de haute pression
- Tubulure de haute pression dûment vissée à la micropompe? Housses de protection fixées à la micropompe
- Housse de protection patient mise en place
- Aspiration des vapeurs sous la housse installée
- Dispositif ERBE démarré
- Instruments, équipements, gants et fils préparés pour la fermeture de l'abdomen

Application procédure

- Placer les seringues contenant la chimio dans l'injecteur à haute pression
- Connexion de la tubulure à haute pression à la seringue et fixation de la housse de protection à l'aseringue
- Valve antireflux connectée sur la seringue de droite ou non connectée si une seule seringue
- Purger les seringues en circuit fermé
- Configurer l'injecteur : volume de la seringue, pression max. 20 bars ; flux 30 ml/min
- Vérifier les écrans pour monitoring à distance
- Tous les membres du personnel quittent la salle d'opération
- Porte d'accès en salle bloquée
- Injection télécommandée (à distance) de la première substance de chimio

PIPAC : Installation Salle / Patient

PIPAC : Extérieur Salle Intervention

PIPAC : Déroulement

2 temps principaux :

- Coelioscopie exploratrice avec biopsies
- Procédure PIPAC

PIPAC : Déroulement

* Coelioscopie exploratrice

- 2 trocarts à ballonnets placés sur la ligne médiane:
 - épigastrique (11 mm) pour la caméra
 - sous-ombilical (12 mm) pour le nébulisateur

- Réglages de l'insufflation de la colonne: Pression à 12 mmHg et Débit à 3 L/min

PIPAC : Déroulement

* Coelioscopie exploratrice

- Aspiration de l'ascite / Prélèvement pour cytologie
- Calcul du PCI
- Prélèvement de biopsies péritonéal (flancs et fosses iliaques bilatérales)

PIPAC : Déroulement

- Mise en place des joints d'étanchéité orange sur le port des trocarts
- Mise en place du nébulisateur et de sa tubulure, houssés et de la caméra sur l'arceau
- Branchement insufflation sur le trocart du nébulisateur et exsuflation mural sur le trocart caméra (robinet fermé)
- Bouchons sur les valves ballonnets

PIPAC : Déroulement

- Mise en place de la housse de protection
- Branchement de l'aspiration de la housse via le kit de fixation Hollister et branchement à l'aspirateur de fumée
- Placement chimiothérapie dans l'injecteur et connexion avec la tubulure du nébulisateur

PIPAC : Déroulement

- Vérification de l'étanchéité et du maintien du pneumopéritoine (Débit = 0 ml/l sur le module d'insufflation)

- Préparation de la fermeture (fils, pansements) et protection de la table

- Check List PIPAC

- Sortie de la salle de l'ensemble du personnel

- Lancement de la nébulisation avec l'écran de control extérieur

ePIPAC : Principe

Précipitation électrostatique des molécules de chimiothérapie utilisant la technique de précipitation des fumées chirurgicales en laparoscopie

(déjà certifiée CE, Ultravision, Alesi Surgical Ltd., UK)

ePIPAC : Déroulement

- Générateur spécifique et une électrode atraumatique reliée à un câble d'alimentation (même plaque neutre que le GHF)

- Précipitation électrostatique : permet une **meilleure pénétration de la chimiothérapie** et diminution du temps de pause après la pulvérisation (6 min au lieu de 30 min)

ePIPAC : Déroulement

ePIPAC : Déroulement

(e)PIPAC : Fin Procédure

- Seuls le chirurgien et son aide rentrent : vérification que toute la chimiothérapie a été pulvérisée et arrêt de l'insufflation de CO₂
- Exsufflation patient (prise SEGA murale)
- Retrait de la housse de protection patient et des trocards
- Rentrée des autres intervenants avec moyens de protection obligatoires
- Ablation des trocards, checklist, fermeture des incisions, pansements

(e)PIPAC : Protection

Nébulisation de la chimiothérapie sous pression
→ **Risque de contamination aérienne**

* 1^{ère} barrière: paroi du patient et renfort d'étanchéité

- 2 trocarts à ballonnets
- Joints étanchéité (orange)

* 2^{ème} sécurité: limitation de la diffusion en cas de fuite

- Housses de protection du nébulisateur et du patient
- Double aspiration des particules / aérosols

(e)PIPAC : Protection

* 3^{ème} sécurité: limitation de l'exposition

- EPI : lunette de protection, masque FFP3, blouse renforcée (opérateurs) ou surblouse, surchaussures, double gantage
- Interdiction aux femmes enceintes ou qui allaitent
- Sortie de la salle pendant la nébulisation puis rentrée du chirurgien et de son aide avant le reste de l'équipe
- Tapis absorbants et évacuation des déchets dans des containers DRCT / Nettoyage

(e)PIPAC : Devenir

- * Hospitalisation 2 nuits, sortie à J3**
- * Complications :**
 - Douleur (J2)**
 - Fistule entéro-cutanée (très rare)**
 - Péritonite (très rare)**
- À ce jour, 2 réactions allergiques (platine) et aucune complication observées (hors douleurs)**

(e)PIPAC : Conclusion

= Nouvelle réponse thérapeutique à la carcinose péritonéale :

- surtout à visée palliative
 - avec bonne qualité de vie des patients
 - augmentation espérance de vie
- Peu d'équipements spécifiques (nébulisateur ou « buse », les joints d'étanchéité et la housse de protection patient)
 - Formation des équipes avec courbe d'apprentissage rapide

Banalisation et application des mesures de sécurité

(e)PIPAC : Film

A blue-tinted photograph of an operating room. In the center, a patient is lying on a table, covered with clear plastic drapes. To the left, a medical cart holds several pieces of equipment, including a monitor displaying a patient's image, a keyboard, and various control units. A large overhead surgical light fixture is positioned above the patient. In the background, a window with blinds is visible. The overall scene is clean and professional, typical of a hospital operating room.

**Merci
de votre attention**

Ressources

- Figures Péritoine : John Libbey Eurotext - Hépatogastro & Oncologie Digestive et <https://microbiologiemedicale.fr/pleuresie-pericardite-peritonite-arthrite/#Infections%20du%20liquide%20d'acite%20et%20p%C3%A9ritonites>
- Figures PMP et mésothélium : <https://www.snfge.org/content/15-mesotheliome-peritoneal>
- Photos CHIP : source interne
- Peritoneal Cancer In Men – CancerWalls
- Chimiothérapie Hyperthermique Intra-Péritonéale, université de Lyon