Le Suivi Les Complications

En denture temporaire

- Décolorations coronaires : rouges, grises, jaunes
- Complications parodontales
 - ✓ Résorptions inflammatoires
 - √ Résorptions de remplacement

1


Décolorations coronaires

- Fréquentes
- Réversibles Stade 1 début 2
- Décoloration précoce, 2 ou 3 semaines ne signe pas une atteinte pulpaire
- Signe une atteinte pulpaire lorsqu'elle survient après plusieurs mois



ว

Décolorations coronaires Brunes Rougeâtres Hémorragie pulpaire Peuvent s'atténuer Surveillanceclinique et radiographique de la vitalité pulpaire, et de l'atteinte parodontale





Pulpectomie

Avulsion



- Résorption radiculaire plus du 1/3 de la racine
- Fistule, abcès



Atteinte parodontale modérée

Surveillanceclinique et radiographique de l'atteinte parodontale et de la résorption radiculaire

Pulpectomie ou Abstention?

- 48 dents avec pulpectomie, 25 suivies jusqu'à éruption de la dent permanente
- 97 dents sans pulpectomie, 28 suivies jusqu'à éruption de la dent permanente


Sans autre symptôme que la décoloration la pulpectomie n'améliore pas le pronostic de la dent permanente






SurveillanceClinique et radiographique

Holan G. Dental Traumatology 2006 Feb;22(1):14-17.





/




Complications Parodontales

• Résorption inflammatoire, avec résorption accélérée de la racine temporaire et perte

prématurée de la dent

 Ankylose et/ou résorption de remplacement, fréquente après les intrusions, retard ou absence de résorption radiculaire, voire une inclusion du germe successionnel





« sa dent est grise »

Nécrose Pulpaire, atteinte parodontale

Selon la coopération de l'enfant


Fistule


Résorption inflammatoire

Pulpectomie
Oxyde de Zn/Eugénol

11







Nécrose Pulpaire, Atteinte Parodontale
Fracture coronaire de 51 ... Abstention ?

4 ans

4 ans

4 yulsion

4 mois

18

Le Remplacement Prothétique


Après l'éruption des canines temporaires, stabilité du périmètre d'arcade même en cas de perte prématurée des incisives :


- Prothèse amovible
- Prothèse fixée




20
































+ 4 ans

























Traumatologie des dents temporaires Diagnostic, L'âge de l'enfant, maturation des germes successionnels Limiter l'inflammation au maximum Le suivi clinique et radiographique 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois 6 mois1 ans Tous les ans jusqu'à éruption de la dent permanente Certificat Médical Initial (Médico-légal)



