









Médicaments antiviraux VHC (voie orale)





COMBINAISONS

Tous géotypes	SOF+LDV	HARVONI® (sofosbuvir + lépidasvir) GILEAD		1 comprimé (400mg de sofosbuvir + 90 mg de Ledipasvir) 1 fois/jour		Au cours ou en dehors d'un repas. Peut être prescrit seul ou associé à la ribavirine.
Géotypes 1 et 4	OBV+PTV+RTV	VIEKIRAX® (Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir) ABBVIE		2 comprimés (12,5mg de ombitasvir + 75mg de paritaprevir + 50mg de ritonavir) 1 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé au Exviera® (G1) et/ou à la ribavirine (G1 et G4)



INHIBITEUR NS5B

Tous géotypes	SOF	SOVALDI® (sofosbuvir) GILEAD		1 comprimé (400mg de sofosbuvir) 1 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé à un anti-VHC direct et/ou à la ribavirine et éventuellement à l'interféron pégylé.
Géotype 1	DSV	EXVIERA® (dasabuvir) ABBVIE		1 comprimé (250mg de dasabuvir) 2 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé au Viekirax et éventuellement à la ribavirine.























INHIBITEUR NS5A

Tous géotypes	DCV	DAKLINZA® (daclatasvir) BMS	 	1 comprimé (60mg de daclatasvir) 1 fois/jour 1 comprimé (30mg de daclatasvir) 1 fois/jour	 	Au cours ou en dehors d'un repas. Doit obligatoirement être associé à un anti VHC direct et/ou à la ribavirine.
---------------	------------	--	--	--	--	---

INHIBITEUR DE PROTÉASE

Géotypes 1 et 4	SMV	OLYSIO® (simeprevir) JANSSEN		1 gélule (150mg de simeprevir) 1 fois/jour		Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associé à un anti VHC direct et/ou à la ribavirine.
-----------------	------------	---	---	---	---	--

ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE

Tous géotypes	RBV	COPEGUS® (ribavirine) ROCHE	 	2 ou 3 comprimés (200mg de ribavirine) 2 fois/jour 1 comprimé (400mg de ribavirine) 2 fois/jour	   	Au cours d'un repas. Doit obligatoirement être associée à un anti-VHC direct et éventuellement à l'interféron pégylé.
Tous géotypes	RBV	REBETOL® (ribavirine) MSD		2 ou 3 gélules (200mg de ribavirine) 2 fois/jour	 	
Tous géotypes	RBV	RIBAVIRINE générique 200 mg BIOGARAN / MYLAN / SANDOZ	  	2 ou 3 comprimés ou gélules (200mg de ribavirine) 2 fois/jour	   	Les dosages 200 et 400mg peuvent être combinés pour atteindre 800 à 1200mg par jour répartis en 2 prises (400 ou 600mg matin et 400 ou 600mg soir).
Tous géotypes	RBV	RIBAVIRINE générique 400 mg BIOGARAN / MYLAN	 	1 comprimé (400mg de ribavirine) 2 fois/jour	   	



Toutes les infos sur vos traitements dans nos Infocartes



Disponible sur notre site, la brochure Mon premier traitement ARV



Vous prenez d'autres médicaments que les ARV ? Vérifiez leur compatibilité avec votre traitement grâce à notre Règlette

Ligne d'écoute : 01 43 67 00 00, du lundi au vendredi de 15h à 18h
www.actions-traitements.org

