



## HLMA206Y - Mathématiques S2 PEIP

Contrôle continu final - 21/05/2021 - Durée 2h00 (2h40 avec 1/3 temps)

Calculatrice et documents interdits. Le sujet regroupe cinq exercices indépendants, deux en algèbre linéaire et trois en analyse.

### Partie algèbre linéaire

#### Exercice 1 (Applications linéaires)

Les applications suivantes sont-elles  $\mathbb{R}$ -linéaires? Expliquez clairement votre réponse.

- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = \bar{z}$  (si  $z = a + ib$ ,  $\bar{z} = a - ib$ ).
- $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = \sin(x + y)$ .
- $d : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $d(M) = \det(M)$ . (On rappelle que  $M_2(\mathbb{R})$  est l'ensemble des matrices  $2 \times 2$  à coefficients dans  $\mathbb{R}$ ).

#### Exercice 2 (Étude d'une application linéaire)

Soit  $f : \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$  l'application définie par  $f(x, y, z, t) = (y, z, t, x)$ , où  $x, y, z, t$  sont des nombres complexes.

- Montrer que  $f$  est  $\mathbb{C}$ -linéaire et écrire sa matrice dans la base canonique de l'espace vectoriel  $\mathbb{C}^4$ .
- Calculer  $f^4$  et en déduire que  $f$  est inversible. Calculer  $f^{1685}$ .
- Soit  $g : \mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4$  défini par  $g(u) = f(u) - u$ . Calculer le noyau de  $g$ .
- Soit  $a$  un nombre complexe et  $u = (1, a, a^2, a^3)$ . Trouver une condition sur  $a$  pour que les vecteurs  $u$  et  $f(u)$  forment une famille liée. Si tel est le cas, exprimer le complexe  $\lambda$  tel que  $f(u) = \lambda u$  en fonction de  $a$ . Quelles sont les valeurs de  $a$  possibles?

On note  $B$  la famille formée par les quatre vecteurs

$$\varepsilon_0 = (1, 1, 1, 1), \quad \varepsilon_1 = (1, i, -1, -i), \quad \varepsilon_2 = (1, -1, 1, -1), \quad \varepsilon_3 = (1, -i, -1, i).$$

- Ecrire la matrice de  $B$  dans la base canonique et calculer son déterminant. En déduire que  $B$  est une base de  $\mathbb{C}^4$ .
- Calculer la matrice de  $f$  dans la base  $B$ .

## Partie analyse

### Exercice 3 (Bases de l'intégration)

- [Cours] Qu'est-ce qu'une primitive ? Énoncer le théorème fondamental de l'analyse.
- Donnez 3 subdivisions différentes de l'intervalle  $[0, 1]$ .
- On note  $E(x)$  la partie entière d'un réel  $x$ . Soit  $f : [0, 16] \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$f(x) = E(\sqrt{x}).$$

Montrer que la fonction  $f$  est en escalier. Calculer son intégrale sur l'intervalle  $[0, 16]$ .

### Exercice 4 (Calculs de primitives)

Calculez les primitives suivantes :

- $\int x \cos(2x) dx$ .
- $\int \cos^3 x \sin^4 x dx$  (on pourra poser  $u = \sin x$ ).
- $\int \frac{dx}{x(x-1)(x+1)}$  (on pourra écrire cette fraction rationnelle comme une somme d'éléments simples).

### Exercice 5 (Un développement limité)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $f(x) = (1+x)^3 + 6 \cos(x)$ .

- Calculer le développement limité de  $f$  en 0 à l'ordre 3.
- Au vu de ce développement limité, quelle est l'équation de la tangente au graphe de  $f$  au point  $(0, 7)$  ? Que peut-on dire de la position du graphe de  $f$  par rapport à la tangente au voisinage de ce point ? Faire un dessin schématique de la tangente et du graphe dans cette région.